

## Risicoscorelijst delier

<b>Predisponerende factoren patiënt:</b>	<b>datum</b> .....	<b>score</b> 0 = niet aanwezig
1. delier of verwardheid in de voorgeschiedenis	3	
2. hersentumor / CVA / dementie / Parkinson	3	
3. verandering opioïde medicatie	3	
4. gebruik van alcohol (> 4 eenheden/dag)	2	
5. leeftijd > 70 jaar	1	
6. gebruik van drugs	1	
7. koorts > 38.5°C	1	
8. metabole stoornis	1	
9. hardhorendheid of slechthoortheid	1	
10. ingreep onder narcose	1	
<b>Score 3 of meer:</b> start Delier Observatie Screening (DOS)		

## Delier Observatie Screening (DOS)

© M. Schuurmans, Utrecht 2001

<b>Observatie</b>  <b>de patiënt .....</b>		dag dienst			late dienst			nacht dienst			
		nooit	soms- altijd	weet niet	nooit	soms- altijd	weet-niet	nooit	soms- altijd	weet-niet	
1	zakt weg tijdens gesprek of bezigheden	0	1	-	0	1	-	0	1	-	<b>totaalscore van deze dag</b>  <b>(0-39)</b>  ▼
2	is snel afgeleid door omgeving	0	1	-	0	1	-	0	1	-	
3	heeft aandacht voor gesprek of handeling	1	0	-	1	0	-	1	0	-	
4	maakt vraag of antwoord niet af	0	1	-	0	1	-	0	1	-	
5	geeft antwoorden die niet passen op de vraag	0	1	-	0	1	-	0	1	-	
6	reageert traag op opdrachten	0	1	-	0	1	-	0	1	-	
7	denkt ergens anders te zijn	0	1	-	0	1	-	0	1	-	
8	beseft wel welk dagdeel het is	1	0	-	1	0	-	1	0	-	
9	herinnert zich recente gebeurtenis	1	0	-	1	0	-	1	0	-	
10	is plukkerig, rommelig, rusteloos	0	1	-	0	1	-	0	1	-	
11	trekt aan infuus, sonde, catheter, enz.	0	1	-	0	1	-	0	1	-	
12	is snel of plotseling geëmotioneerd	0	1	-	0	1	-	0	1	-	
13	ziet of hoort dingen die er niet zijn	0	1	-	0	1	-	0	1	-	
<b>totaal score per dienst ►</b>											
<b>DOS eindscore = totaalscore van deze dag gedeeld door 3 ►</b>											

<i>geen delier</i>		<b>&lt; 3</b>
<i>waarschijnlijk delier</i>	◀	<b>≥ 3</b>